

Captogastril® stick pack

Polvere orosolubile in stick pack

CE 0426

Dispositivo Medico

CAPTOGASTRIL® polvere orosolubile in stick pack è un dispositivo medico utile per contrastare i sintomi correlati a cattiva digestione ed iperacidità gastrica.

IDENTIFICAZIONE, COMPOSIZIONE E FINALITÀ DI UTILIZZO DEL DISPOSITIVO MEDICO

Diversi fattori come una dieta squilibrata, stress, trattamenti farmacologici prolungati o l'assunzione di cibi e bevande che causano un alto livello di acidità, possono portare all'insorgenza di sintomi da iperacidità gastrica o cattiva digestione come: nausea, gonfiore, sensazione di pienezza dopo i pasti, rigurgito acido e pirosi.

MECCANISMO DI AZIONE

CAPTOGASTRIL® stick pack contiene simeticone, un agente antischiuma con attività surfattante, che riduce la tensione superficiale delle bolle gassose nel muco e nel materiale presente nello stomaco e nell'intestino, favorendone la rottura e prevenendone la formazione. In questo modo, l'eccessiva quantità di gas può essere drenata ed eliminata più facilmente dal tratto gastrointestinale.

Inoltre, sodio bicarbonato, magnesio carbonato e il magnesio idrossido neutralizzano l'iperacidità gastrica.

CAPTOGASTRIL® stick pack aiuta a ritrovare un senso di leggerezza, grazie alla sua piacevole effervescenza, data dalla presenza di sodio bicarbonato e acido citrico.

COMPOSIZIONE

Ingrédients funzionali: simeticone, sodio bicarbonato, magnesio carbonato e magnesio idrossido.

Eccipienti: xilitolo, acido citrico, sorbitolo, aroma limone, biossido di silicio, ginger o.e. (aroma), sucralosio, acesulfame K, saccarina sodica.

CONFEZIONE

Ogni confezione contiene 12 stick pack.

DOSAGGIO E MODALITÀ DI ASSUNZIONE

Si raccomanda di assumere:

Per ripristinare la normale digestione: 1 stick pack dopo i due pasti principali, per un massimo di 2 stick pack al giorno.

Per contrastare l'iperacidità gastrica: 2 stick pack dopo i due pasti principali, per un massimo di 4 stick pack al giorno.

Assumere il prodotto sciogliendo il contenuto di uno stick pack direttamente in bocca.

Tra i 6 e 18 anni utilizzare il prodotto controllo medico.

In gravidanza o allattamento consultare il medico prima di assumere il prodotto.

EFFETTI INDESIDERATI

Le dosi necessarie per ottenere un effetto terapeutico hanno raramente causato effetti collaterali.

Il prodotto può avere effetti lassativi in quanto contiene xilitolo.

INTERAZIONI CON FARMACI E INTEGRATORI ALIMENTARI

A causa della presenza di sostanze adsorbenti, **CAPTOGASTRIL®** stick pack può ritardare o ridurre l'assorbimento di farmaci somministrati in concomitanza. Ad esempio, potrebbe interferire con antiacidi, anticonvulsivanti, antibiotici, farmaci antiacidi e

antitiroidei come la levotiroxina. Si raccomanda inoltre di assumere il prodotto ad almeno 2 ore di distanza da pillole anticoncezionali. In ogni caso, è sempre altamente raccomandabile consultare il vostro medico prima di iniziare a usare un dispositivo medico assorbente come **CAPTOGASTRIL®** stick pack.

Non sono note interazioni con integratori alimentari.

Tuttavia, come regola generale, tutti gli integratori alimentari, tra cui vitamine, nutrienti, sostanze erbalì e rimedi omeopatici, dovrebbero essere ingeriti almeno due ore prima o due ore dopo l'uso di **CAPTOGASTRIL®** stick pack.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

CAPTOGASTRIL® stick pack deve essere conservato in un luogo fresco e asciutto. Conservare a temperatura ambiente inferiore a 25°C. Non assumere il prodotto se lo stick pack risulta danneggiato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

AVVERTENZE E CONTROINDICAZIONI

Utilizzare il prodotto dai 6 ai 18 anni solo sotto la supervisione di un medico.

In gravidanza o allattamento consultare il medico prima di assumere il prodotto.

Il prodotto contiene sali di sodio e magnesio, consultare un medico in caso di terapie farmacologiche in atto o regimi dietetici controllati. Il tempo richiesto per raggiungere un effetto soddisfacente dipende dalla causa sottostante alla sovrapproduzione gas.

Non è indicato in pazienti che soffrono di ipernatriemia o ipermagnesemia. In caso di pressione alta usare il prodotto solo dopo consiglio medico.

Non utilizzare per più di 30 giorni consecutivi; se i sintomi persistono consultare il medico.

Non assumere in caso di intolleranza e ipersensibilità nota ai componenti.

Ogni stick pack è monouso e va aperto solo al momento dell'utilizzo.

SCADENZA

Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro, correttamente conservato.

SMALTIMENTO

Il dispositivo scaduto o comunque da eliminare deve essere gestito come da regolamento di gestione dei rifiuti dell'Ente Gestore Locale.

Non disperdere in nessun caso il prodotto o la sua confezione nell'ambiente.

Data Ultima Revisione: 12/2023



SIIT srl

Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italia



Captogastril® stick pack

Orosoluble powder in stick pack

CE 0426

Medical device

CAPTOGASTRIL® orosoluble powder in stick pack is a medical device useful to counteract symptoms related to digestive difficulties and gastric hyperacidity.

IDENTIFICATION, COMPOSITION AND PURPOSE OF USE OF THE MEDICAL DEVICE

Various factors such as unbalanced diet, stress, prolonged pharmacological treatment, intake of foods and drinks that cause high acidity levels, can lead to suffer from symptoms related to gastric hyperacidity or poor digestion such as nausea, bloating, feeling of fullness after meals, acid regurgitation and heartburn.

MECHANISM OF ACTION

CAPTOGASTRIL® stick pack contains simethicone, an antifoaming agent with surfactant activity, that reduces the surface tension of the air bubbles in mucus and in the material present in the stomach and bowel, favoring their breakage and preventing their formation. In this way, the excessive amount of gas can more easily be drained and eliminated from the gastrointestinal tract.

Furthermore, sodium bicarbonate, magnesium carbonate and magnesium hydroxide neutralize gastric hyperacidity. In addition, due to its pleasant effervescence, given by the presence of sodium bicarbonate and citric acid, **CAPTOGASTRIL® stick pack** helps to regain a sense of lightness.

COMPOSITION

Functional ingredients: simethicone, sodium bicarbonate, magnesium carbonate and magnesium hydroxide.

Excipients: xylitol, citric acid, sorbitol, lemon flavoring, silicon dioxide, ginger e.o. (flavoring), sucralose, acesulfame K, sodium saccharine.

PACKAGE

Each box contains 12 stick packs.

DOSAGE AND MODE OF USE

It is recommended to take:

To restore normal digestion: 1 stick pack after the two main meals, up to a maximum of 2 stick packs per day.

To contrast gastric hyperacidity: 2 stick pack after the two main meals, up to a maximum of 4 stick packs per day.

Take the product by dissolving the contents of a sachet directly into the mouth.

Between 6 and 18 years of age, use the product only under the supervision of a doctor. If you are pregnant or breastfeeding, consult your doctor before taking the product.

SIDE EFFECTS

The doses necessary to obtain a therapeutic effect have very rarely caused side effects.

The product can have laxative effects, since contains xylitol.

INTERACTIONS WITH DRUGS AND DIETARY SUPPLEMENTS

Due to the presence of adsorbents substances, **CAPTOGASTRIL® stick pack** may delay or reduce the absorption of drugs administered concomitantly. For example, it could interfere with antacids, anticonvulsant, antibiotics, antidiabetic and anti-thyroid drugs such

as levothyroxine. It is also recommended to take the product at least 2 hours away from contraceptive pills. In any case, it is always highly recommendable to consult your doctor before starting to use an absorbent medical device as **CAPTOGASTRIL® stick pack**.

No interactions with dietary supplements are known. However, as a general rule, all dietary supplements, including vitamins, nutrients, herbal substances and homeopathic remedies, should be ingested at least two hours before or two hours after the use of **CAPTOGASTRIL® stick pack**.

STORAGE

CAPTOGASTRIL® stick pack must be stored in a cool and dry place. Store at controlled ambient temperature under 25°C. Do not take the product if the stick pack is damaged. Keep packs out of the reach of children.

WARNINGS AND CONTRAINDICATIONS

Use the product from 6 to 18 years only under the supervision of a doctor. If you are pregnant or breastfeeding, consult your doctor before taking the product.

The product contains sodium and magnesium salts, consult a doctor in case of ongoing drug therapies or controlled dietary regimes. The time required to achieve a satisfactory effect depends on the underlying cause of the gas overproduction. It is not suitable for patients suffering from hypernatremia or hypermagnesemia; If you have high blood pressure use the product only after taking medical advice.

Do not use the product for more than 30 consecutive days; If symptoms persist, consult your doctor.

Do not take in case of intolerance and known hypersensitivity to components. Each stick pack is disposable and should only be opened at the time of use.

EXPIRY DATE

Do not use after the expiration date indicated on the package. The expiration date refers to the product in intact packaging, properly stored.

DISPOSAL

The device that has expired or is to be eliminated must be managed according to the waste management regulations of the Local Managing Body. Do not disperse the product or its package in the environment.

Last Revision: 12/2023



SIIT srl

Via Ariosto 50/60
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) - Italia

